

CINTILOGRAFIA COM ANÁLOGO DA SOMATOSTINA (PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM OCTREO-^{99m}Tc)

Radiofármaco: Octreo-^{99m}Tc

Duração: tempo de duração do exame de aproximadamente 5 horas (imagens com 1 hora e 4 horas após a injeção). Não é necessária a permanência do paciente na Medicina Nuclear durante o intervalo entre as imagens.

Como o exame é realizado: Após 1 hora e 4 horas da administração endovenosa do radiofármaco (Octreo-^{99m}Tc) serão realizadas imagens do corpo inteiro com duração de aproximadamente 60 minutos cada.

Preparo do paciente:

- Deve ser considerado descontinuar a terapia com octreotídeo ou octreotato antes da administração do radiofármaco:
 - Sandostatina via oral (octreotídeo frio) – suspender 48 horas antes do exame.
 - Sandostatina de depósito (Longa ação) – suspender 3 semanas antes do estudo (confirmar possibilidade de suspensão com o médico responsável).
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.