

CINTILOGRAFIA DAS PARATIREÓIDES

Radiofármaco: SESTAMIBI - ^{99m}Tc

Duração: O tempo médio do exame é de 03 horas. Eventualmente, o exame pode se estender até 04 horas.

Como o exame é realizado: O paciente receberá por via endovenosa, um radiofármaco capaz de se concentrar nas glândulas paratireóides, com distribuição variável quando estas apresentam determinadas alterações. Logo a seguir inicia-se a aquisição das imagens através da gama-câmara. Este exame é composto de 2 etapas:

- 1ª Etapa: Após 10 minutos da injeção o paciente é posicionado na câmara de cintilação e são realizadas imagens durante 30 minutos
- 2ª Etapa: Aproximadamente 02 horas após a injeção serão realizadas novas imagens.

Eventualmente, podem ser necessárias imagens adicionais mais tardias para complementar o exame, a critério do médico nuclear.

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum.
 - Não é necessário suspensão de medicamentos de uso diário.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.