

CINTILOGRAFIA DE Esvaziamento Gástrico (Líquidos)

Radiofármaco: Colóide -^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 90 minutos.

Como o exame é realizado: O paciente ingere o radiofármaco preparado com água e é imediatamente posicionado debaixo da câmara de cintilação. As imagens são realizadas por 60 minutos.

Preparo do paciente:

- Jejum
 - Adulto: mínimo de 6 horas
 - Crianças: mínimo de 3 horas
 - Bebês: realizar o exame no intervalo entre as mamadas, o mais próximo possível do horário da próxima mamada. Trazer 01 mamadeira com leite e 01 mamadeira vazia (ou o copo de preferência da criança).
 - Restrição de medicação: À critério do médico solicitante. Caso seja solicitado pelo médico solicitante, recomenda-se a suspensão dos seguintes medicamentos por 3 dias:
 - Pró-cinéticos: Metoclopramida (Plasil[®]), Bromoprida (Digesan[®]), Cisapride (Prepulsid[®]), Domperidona (Motilium[®], Predial[®]), Eritromicina (Ilosone[®]).
 - Opióides: Codeína, Morfina, Meperidina, Fentanil, Propoxifeno (Algafan[®]), Tramadol (Tramal[®]).
 - Benzodiazepínicos
 - Anti-colinérgicos: Atropina (Atrosedina[®], Lomotil[®], Vagostesil[®]), Escopolamina ou Hioscina (Buscopan[®], Doralgin[®]), Hiosciamina (Tropical[®]), Biperideno (Akineton[®]), Triexifenidil (Artane[®]), Diclomina (Bentyl[®]), Benactizina (Asmoterona[®]), Ciproheptadina (Periatin[®], Periavit[®]).
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.