

CINTILOGRAFIA DE Esvaziamento Gástrico (Sólidos)

Radiofármaco: Colóide ^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 04 horas e meia.

Como o exame é realizado: O paciente ingere o radiofármaco preparado na forma de sanduíche com clara de ovo, geléia e torradas, e um copo de água com 200 ml, o lanche deve ser ingerido totalmente em 10 minutos. Se o paciente preferir, pode comer separado ovo e as torradas com geléia. Terminado o lanche, o paciente é imediatamente posicionado debaixo da câmara de cintilação. As imagens com duração de 1 minuto são adquiridas após a ingestão do lanche nos seguintes momentos: imediatamente e após 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas. Nos intervalos entre as imagens o paciente não precisa permanecer no serviço, deve entretanto manter jejum até o fim do estudo. Água é liberado.

Preparo do paciente:

- **Jejum**
 - Adulto: mínimo de 6 horas
 - Crianças: mínimo de 3 horas
 - **Restrição de medicação:** Caso seja solicitado pelo médico solicitante, recomenda-se a suspensão dos seguintes medicamentos por 3 dias:
 - Pró-cinéticos: Metoclopramida (Plasil[®]), Bromoprida (Digesane[®]), Cisapride (Prepulsid[®]), Domperidona (Motilium[®], Predial[®]), Eritromicina (Ilosone[®]).
 - Opióides: Codeína, Morfina, Meperidina, Fentanil, Propoxifeno (Algafan[®]), Tramadol (Tramal[®]).
 - Benzodiazepínicos
 - Anti-colinérgicos: Atropina (Atrosedina[®], Lomotil[®], Vagostesil[®]), Escopolamina ou Hioscina (Buscopan[®], Doralgin[®]), Hiosciamina (Tropical[®]), Biperideno (Akineton[®]), Triexifenidil (Artane[®]), Dicyclomina (Bentyl[®]), Benactizina (Asmoterona[®]), Ciproheptadina (Periatin[®], Periavit[®]).
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Favor chegar 15 minutos antes do horário agendado para preenchimento do cadastro.