

CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PARA AVALIAÇÃO DE NECROSE

Radiofármaco: Pirofosfato -^{99m}Tc e Sestamibi- ^{99m}Tc

Duração: Tempo médio de 04:30 horas. Não é necessária a permanência do paciente na clínica durante o intervalo entre a injeção e as imagens.

Como o exame é realizado: O exame é composto de 2 etapas:

1. **Imagem de necrose:** O 1º radiofármaco (pirofosfato-^{99m}Tc) é injetado na veia do paciente. São realizadas imagens 3 horas após a injeção. As imagens duram ao redor de 40 minutos.
 2. **Imagem de viabilidade:** O 2º radiofármaco (sestamibi-^{99m}Tc) é injetado na veia do paciente imediatamente após o término das imagens da primeira etapa, com o paciente posicionado debaixo da câmara de cintilação. Essas novas imagens duram ao redor de 20 minutos.
-

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum ou preparo especial.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de medicina nuclear, ecocardiogramas, eletrocardiogramas, cateterismo, teste ergométrico e/ou angiotomografia.
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.