

CINTILOGRAFIA DE REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO

Radiofármaco: Fitato - ^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 1 hora.

Como o exame é realizado:

- O paciente ingere radiofármaco em um pouco de leite (preferencialmente) ou a água, em seguida toma mais um pouco de líquido, sem estar radiomarcado. Logo em seguida, o paciente é posicionado no aparelho de cintilografia (gama-câmara) para aquisição imediata das imagens com duração de 30 minutos. O radiofármaco não tem gosto nem há efeitos colaterais.
-

Preparo do paciente:

- **Jejum de acordo com a idade:**
 - Lactentes: suspender a última amamentação antes do exame, realizar o exame no intervalo entre as mamadas, o mais próximo possível do horário da próxima mamada. No caso de amamentação com leite materno será necessário a ordenha de quantidade suficiente para a adição do radiofármaco.
 - Crianças < 4 meses: jejum de 3 horas
 - Crianças > 4 meses e Adultos: jejum de 6 horas.
 - **Restrição de medicação:** de acordo com o médico solicitante.
 - **Crianças:** Trazer 2 mamadeiras (uma com leite e outra vazia) e roupa para troca. No caso de pacientes que não ingerem leite, o exame será realizado com a ingestão de água.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.