

CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE SANGRAMENTO INTESTINAL INTERMITENTE

Radiofármacos: Hemácias marcadas-^{99m}Tc

Duração: separar o **dia todo** para a realização do exame. Frequentemente é necessário realizar uma imagem após 24 horas da injeção.

Como o exame é realizado:

O paciente recebe inicialmente uma injeção de pirofosfato de sódio para a sensibilização das hemácias. Após 15-30 minutos, o radiofármaco é injetado na veia do paciente com o mesmo já posicionado na câmara de cintilação para realização de imagens que duram aproximadamente 60 minutos. Após isso, o paciente pode levantar-se e movimentar-se. Novas imagens são realizadas a cada 60 minutos até a detecção do sangramento (cada imagem dura cerca de 10 minutos). Frequentemente é necessário realizar uma imagem no dia seguinte, chamada de imagem de 24 horas. Não é necessária a permanência do paciente na clínica durante o intervalo entre as imagens.

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum.
 - Não é necessária a suspensão de medicamentos.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.