

CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA

Radiofármaco: Pertecnetato - ^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 90 minutos

Como o exame é realizado: Será realizada uma sondagem vesical e esvaziada a bexiga antes da obtenção das imagens. Após isso, o paciente é posicionado na gama-câmara (aparelho). O radiofármaco é então injetado na sonda vesical seguido de 250 ml de soro fisiológico (ou menos, até o limite da bexiga) para encher progressivamente a bexiga até que o paciente apresente vontade de urinar. São realizadas imagens durante todo o processo de enchimento da bexiga até o paciente sentir vontade de urinar. Quando o paciente sentir vontade de urinar o mesmo deve avisar. Então é retirada a sonda vesical, um recipiente coletor de urina é posicionado e é solicitado ao paciente que comece a urinar. Novas imagens são adquiridas durante esvaziamento da bexiga.

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum.
 - Não é necessário suspensão de medicamentos de uso diário.
 - Mulheres evitar realizar o exame no período menstrual.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.