

CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA

Radiofármaco: DTPA - ^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 02 horas.

Como o exame é realizado: O paciente é posicionado na câmara de cintilação. Após a administração do radiofármaco na veia do paciente são realizadas imagens dinâmicas durante 40 minutos. Em seguida, o paciente é solicitado para esvaziar a bexiga enquanto novas imagens são adquiridas.

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum.
 - Não é necessário suspensão de medicamentos de uso diário.
 - Hidratar-se bem no dia do exame. Beber vários copos de água antes da injeção do radiofármaco, a menos que exista contra-indicação médica. Continuar bebendo bastante líquido após o término do exame para estimular a micção e eliminar o radiofármaco do corpo.
 - Este exame não deve ser realizado no mesmo dia que a Cintilografia Renal Estática (DMSA). Pode ser realizada 24 horas antes ou 48 horas após o DMSA.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.