

PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM MIBG-¹³¹I

Radiofármaco: MIBG-¹³¹I

Duração: O exame é realizado em 3 dias com duração de aproximadamente 1 hora em cada dia.

Como o exame é realizado: O exame é feito em 2 etapas.

- 1ª Etapa: injeção do MIBG
 - 2ª Etapa: imagens
 - Realizadas após 48 e 72 horas da injeção e duram cerca de 60 minutos cada. Eventualmente imagens adicionais podem ser necessárias.
-

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum.
 - Suspensão de medicamentos: vide Anexo. Informar ao médico solicitante.
 - Fazer o uso de xarope de iodeto de potássio.
 - Iniciar 3 dias antes, tomar no dia e continuar por mais 3 dias após receber a injeção do radiofármaco.
 - Dosagem do Xarope de Iodeto de Potássio:
 - Crianças até 3 anos: 1 colher de chá de 8/8 horas.
 - Crianças de 3 a 10 anos: 1 colher de sobremesa de 8/8 horas.
 - Adultos: 1 colher de sopa de 8/8 horas.
-

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contra-Indicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Favor chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM MIBG-131I (ANEXO)

MEDICAMENTOS A SUSPENDER

(drogas que reduzem captação de MIBG-131I)

ANTI-HIPERTENSIVOS

- Labetalol
- Reserpina: Cardiosarpin, Ortoserpina, Paurerpen, Serpasol, Adelfan, Bredina, Clorana-Reserpina, Diurana-Reserpina, Reserpina, Id-Sedir, Narterion, Rutinopil, Terbolan, Verasil-Compis.
- Bloqueadores dos Canais de Cálcio: Diltiazem (Balcor), Nifedipina (Adalat), Oxcorde, Verapamil (Dilacorone).

ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS

- Amitríptilina e derivados
- Imipramina e derivados
- Doxepina
- Amoxapina
- Loxapina (agente antipsicótico)

SIMPATICOMIMÉTICOS

- Fenilefrina
- Fenilpropanolamina
- Pseudoefedrina
- Efedrina
- Cocaína

ANTI-HIPERTENSIVOS

- Bloqueadores Adrenérgicos
- Betanidina
- Bretilo
- Debrisoquina
- Guanetidina

ANTIDEPRESSIVOS ATÍPICOS

- Maprotileno
- Trazoleno

ANTIPSICÓTICOS

- Acetofenazina
- Perfenazina
- Butirofenona
- Clorpromazina
- Triflupromazina
- Prometazina
- Clorprotixeno
- Tiotixeno
- Droperídol
- Fenotiazinas
- Flufenazina
- Haloperidol
- Mesoridazina
- Pimozide
- Proclorperazina
- Tietilperazina/ Trifluoperazina
- Tioxantinas
- Trioridazina

SIMPATICOMIMÉTICOS

- Anfetamina e derivados: dietilpropil, fenfluramina, mazindol, metilfenidato.
- Fenetrazina e derivados.
- Fentamina e derivados.

BETA SIMPATICOMIMÉTICOS

- Albuterol (Salbutamol)
- Dobutamina
- Dopomina
- Isoetarina
- Isoproterenol
- Metaproterenol
- Terbutalina
- Metaraminol
- Isoproterenol
- Metaproterenol
- Terbutaline
- Metaramino